

# Mégalérythème épidémique (5<sup>e</sup> maladie)

<b>Origine de l'infection</b>	<b>Virale</b>
<b>Mode de contamination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sécrétions respiratoires.</li> <li>&gt; Sang infecté.</li> </ul>
<b>Durée de la contagiosité</b>	De 3 à 7 jours avant l'apparition des premiers boutons.
<b>Importance de la contagiosité</b>	Moyenne
<b>Mesures d'hygiène à prendre dans la structure d'accueil</b>	<p><b>&gt; En cas de mégalérythème :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le mégalérythème épidémique présentant un risque pour les femmes enceintes, informer le personnel et les parents des autres enfants de l'existence d'un cas dans la collectivité.</li> <li>- Recommander aux femmes enceintes et aux personnes atteintes d'anémie hémolytique de consulter leur médecin.</li> </ul> <p><b>&gt; Mesures d'hygiène pour les pathologies dues à une contamination par les sécrétions respiratoires :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavage soigneux des mains.</li> <li>- Nettoyage des sécrétions nasales avec des mouchoirs en papier à usage unique jetés dans une poubelle munie d'un couvercle.</li> <li>- Lavage des surfaces, jouets et autres objets présents dans les lieux fréquentés par l'enfant malade.</li> </ul> <p><b>&gt; Mesures d'hygiène à appliquer pour les pathologies dues à une contamination par du sang :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En cas de plaie, lors de soins dispensés, lavage soigneux des mains et port de gants jetables.</li> <li>- Désinfection des surfaces souillées et du matériel.</li> <li>- En cas de contact avec la peau, nettoyage immédiat à l'eau et au savon, rinçage puis désinfection.</li> <li>- En cas de contact avec une muqueuse, rinçage abondant au sérum physiologique ou à l'eau.</li> </ul>
<b>Éviction de l'enfant</b>	<b>Non</b>
<b>Traitement courant</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Traitement symptomatique :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antipyrétiques pour améliorer le confort de l'enfant.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Commentaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Le mégalérythème épidémique présente un risque particulier pour les femmes enceintes et les personnes atteintes d'anémie hémolytique.</li> <li>&gt; Des mesures spécifiques doivent donc être prises pour éviter tout contact des sujets « à risque » avec les enfants malades. Mais attention : la période de contagiosité débutant souvent avant l'apparition de l'éruption, ces mesures ne préviennent pas la totalité des risques.</li> </ul>